



بازارگان کالا

راهنمای مصرف تغذیه‌ای و سموم بادمجان گلخانه‌ای



NUTRITECH

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶.۳۹۴۹

WWW.BAZARGANKALA.COM



۶

اوج باردهی



۵

تشکیل میوه



۴

گلدهی



۳

رشد رویشی



۲

استقرار نشا



۱

قبل از کشت



دز مصرف



روش مصرف

زمان مصرف

						الیتردر هزارمترمربع	کود آبیاری	Soil Booster 510 سویل بوستر ۵۱۰	
						۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Calbor 805 آمینو کلات کلبور ۸۰۵	
						۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Calcium 1010 آمینو کلات کلسیم ۱۰۱۰	
						۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Fe 510 آمینو کلات آهن ۵۱۰	
						۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	K60 ک ۶۰	
						۱-۱/۵ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Manganese 510 آمینو کلات منگنز ۵۱۰	
						۱-۰/۵ لیتر در هزار	محلول پاشی	MicroMix 222 میکرو میکس ۲۲۲	
						۲-۳ لیتر در هزارمترمربع	کود آبیاری	Salt Gone 1303 سالت گان ۱۳۰۳	
						۱-۰/۵ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Zn 710 آمینو کلات روی ۷۱۰	
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	AminoPotasse 1010 آمینوپتاس ۱۰۱۰	
						۱-۱/۵ لیتر در هزار	محلول پاشی	Fruit Set 525 فروت ست ۵۲۵	
						محلول ۱۰ در هزار به مدت ۲ تا ۵ ثانیه	عوطه‌ور کردن ریشه‌های نشاء	Humic Acid 123 هیومیک اسید ۱۲۳	
						۱-۰/۵ لیتر در هزارمترمربع	کود آبیاری	Humic Acid 123 هیومیک اسید ۱۲۳	
						۱-۲ لیتر در هزارمترمربع	کود آبیاری	Nitro Micro 2505 نیترو میکرو ۲۵۰۵	
						۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	High K 5-10-40 ان پی کا ۴۰-۱۰-۵ های کا	
						۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	High P 10-40-10 ان پی کا ۱۰-۴۰-۱۰ های پی	
						۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Balance 20-20-20 ان پی کا ۲۰-۲۰-۲۰ بالانس	
						۲-۳ کیلوگرم در هزار متر مربع	کود آبیاری	Potassium Calcium Nitrate پتاسیم کلسیم نیترات	
						۱-۲ کیلوگرم در هزار	محلول پاشی	Potassium Calcium Nitrate پتاسیم کلسیم نیترات	

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد. با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می‌گردد. از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال زا نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می‌شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها یا یکدیگر اجتناب گردد.



ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع انجام شود. از تأمین منظم و یکتاوخست کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. [محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود]





زمان مصرف	کود آبیاری	محلول پاشی	کود آبیاری	محلول پاشی	غوطه ور کردن ریشه نشاء	محلول پاشی	مخلوط با خاک	مخلوط با خاک	محلول پاشی
۱ لیتر در هزار مترمربع	۵۰۱ کالر Colour 501	۲-۳ لیتر در هزار	۵۰۱ کالر Colour 501	۰/۳-۰/۵ لیتر در هزار مترمربع	۱۸۱۰ سیلیکات پتاسیم Potassium Silicate 1810	۱-۲ لیتر در هزار	۱۸۱۰ سیلیکات پتاسیم Potassium Silicate 1810	۰/۵-۰/۷۵ درصد	۱۰۱۱ گروس میکسچر Growth Mixture 1011
									۱۰۱۱ گروس میکسچر Growth Mixture 1011
									۲۰-۱۰ کیلوگرم در هر هزار متر مربع
									۲۰-۱۰ کیلوگرم در هر هزار متر مربع
									شستشوی درخت و کاهش جمعیت آفت ۲در هزار
									۳۰۱ وکوزیم گرانول Wokozim Granula
									۴۸۶ گرانول Granule 486
									۱۰۱ فولیور ساپون محلول پاشی * Foliar Soap 101
									۳۰۱ سورفکتانت Surfactant 301

* صابون محلول پاشی ۱۰۱: همراه با آفت کش ها و کودهای محلول پاشی با دز ۱ در هزار و جهت شستشوی گیاه و کاهش جمعیت آفات با دز ۲ در هزار | **سورفکتانت ۳۰۱: در تمامی محلول پاشی ها همراه با آفتکش ها و کودها، قابل توصیه و مصرف می باشد (دز مصرف ۲۵۰ سی سی در هزار)

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان دیصلاح تعیین گردد. | با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد. | از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. | کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. | در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال زا نگهداری شود. | قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. | از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. | در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها با یکدیگر اجتناب گردد.



ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود | در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع؛ انجام شود. | از تأمین منظم و یکنواخت کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. | محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود

