

عامل کلات کنندگی اتانول آمین، جذب و انتقال سریع

معرفی عمومی

“نوتریک کلات بُر ۱۱” دارای مقدار قابل توجهی از عنصر بُر به شکل قابل جذب می باشد. همچنین به دلیل داشتن نیتروژن، اسید آمینه، ماده آلی و بخصوص عنصر مولیبدن، جذب و متابولیسم عنصر بُر به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد. بُر نقش مهمی در گرده افشانی و لقاح گیاهان، تشکیل میوه، خوشه و دانه بندی ایفا می کند و همچنین این امکان را برای گیاه فراهم می آورد که عناصر غذایی مورد نیاز برای سال آینده را ذخیره و خود را برای ورود به فصل جدید آماده کند.

معرفی فنی

ترکیبات					
نوتریک کلات بُر ۱۱ (وزنی / وزنی)	نیتروژن کل (N)	بر کلاته (B)	مولیبدن محلول (Mo)	اسید آمینه آزاد (Free A.A)	ماده آلی (O.M)
	۵٪	۱۱٪	۰/۰۵٪	۳٪	۱۵٪

راهنمای مصرف : روش مصرف و کود آبیاری و محلولپاشی

نوع کشت	زمان مصرف	مقدار مصرف محلول پاشی	مقدار مصرف آبیاری
درختان میوه	در زمان تورم جوانه و همچنین پس از برداشت محصول	۲ - ۱ لیتر در هزار	۸ - ۴ لیتر در هکتار
پسته	قبل از تورم جوانه و همچنین پس از برداشت محصول	۳ - ۲ لیتر در هزار	۱۰ - ۵ لیتر در هکتار
محصولات زراعی	قبل از پر کردن دانه / غده	۲ - ۱ لیتر در هزار	۸ - ۴ لیتر در هکتار
چغندر قند و سایر محصولات قندی	در زمان تشکیل قند در غده، میوه و یا اندام گیاه	۳ - ۲ لیتر در هزار	۱۰ - ۵ لیتر در هکتار
سبزی و صیفی	پیش از گلدهی	۱ - ۰/۵ لیتر در هزار	۱۰ - ۵ لیتر در هکتار
مرکبات	پیش از گلدهی و همچنین پس از برداشت	۲ - ۱ لیتر در هزار	۱۰ - ۵ لیتر در هکتار
تاکستان	قبل از تورم جوانه و همچنین پس از برداشت	۱ - ۰/۵ لیتر در هزار	۱۰ - ۵ لیتر در هکتار
گلخانه ها	پیش از گلدهی	۷۵ - ۰/۵ لیتر در هزار	۷۵ - ۵۰/۵ لیتر در هزار متر مربع

(تکرار در صورت نیاز)

B chelate 11

ترکیبات (درصد وزنی / وزنی):

۵٪	نیتروژن کل (N)
۱۱٪	بر کلاته (B)
۰/۰۵٪	مولیبدن محلول (Mo)
۳٪	اسید آمینه آزاد (Free A.A)
۱۵٪	ماده آلی (O.M)

پمپ فرم فیزیکی : مایع / L


مناسب برای:

- درختان میوه
- محصولات زراعی
- سبزی و صیفی
- محصولات گلخانه ای



شماره ثبت کودی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور: ۳۵۵۸۳

تولید کننده: شرکت بازارگان کالا



B chelate 11

ویژگی ها و تمایزات

- _ دارای عامل کلات کننده اتانول آمین
- _ منبع بسیار مناسب برای تامین سریع عنصر بُر
- _ کمک به حرکت قندها در گیاه
- _ ضروری برای تقسیم سلولی
- _ تأثیر در گرده افشانی
- _ گلدهی و تشکیل خوشه
- _ افزایش گل انگیزی و افزایش نرخ تبدیل گل به میوه
- _ کاهش سال آوری درختان

ملاحظات اختصاصی

- _ از اختلاط با ترکیبات قلیایی ، مشتقات گوگرد و سموم اجتناب شود.
- _ در درختان میوه هسته دار، حتما قبل از مصرف در سطح محدود و به دقت آزمایش شود.
- _ در مناطقی که سمیت بر شایع است و یا غلظت بر در گیاه بالا است، استفاده نشود.

ملاحظات عمومی

- _ مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه ، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک، برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد.
- _ با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی، قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد.
- _ از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود.
- _ کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.
- _ در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال زا نگهداری شود.
- _ قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود.
- _ از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود.